

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

**Gebrauchsinformation:
Information für die Anwenderin/
den Anwender**

Legalon forte 140 mg Kapseln

Mariendistelfrüchte-Extrakt (Silymarin)

Lebertherapeutikum**Anwendungsgebiete**

Toxische Leberschäden; zur unterstützenden Behandlung bei chronisch-entzündlichen Lebererkrankungen und Leberzirrhose.

Die Arzneimitteltherapie ersetzt nicht die Vermeidung der die Leber schädigenden Ursachen (z. B. Alkohol).

Bei Gelbsucht (hell- bis dunkelgelbe Hautverfärbung, Gelbfärbung des Augenweiß) sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Hinweis: Dieses Arzneimittel ist nicht zur Behandlung von akuten Vergiftungen geeignet.

Gegenanzeigen**Was müssen Sie vor der Einnahme von Legalon forte 140 mg Kapseln beachten?**

Legalon forte 140 mg Kapseln dürfen nicht eingenommen werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Silymarin, Weizenstärke oder einem der sonstigen Bestandteile von Legalon forte 140 mg Kapseln sind.

Warnhinweis:

Weizenstärke kann geringe Mengen Gluten enthalten, die aber auch für Patienten, die an Zöliakie leiden, als verträglich gelten. Dieses Arzneimittel enthält zudem Lactose. Bitte nehmen Sie Legalon forte 140 mg Kapseln daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Zur Anwendung von Legalon forte 140 mg Kapseln während Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine Erfahrungen vor. Deshalb sollte eine Anwendung nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Legalon forte 140 mg Kapseln nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Legalon forte 140 mg Kapseln sonst nicht richtig wirken können!

Wie viel von Legalon forte 140 mg Kapseln und wie oft sollten Sie Legalon forte 140 mg Kapseln einnehmen?

Zu Beginn der Behandlung 3-mal täglich 1 Kapsel (Mariendistelfrüchte-Extrakt entsprechend 420 mg Silymarin).

Als Erhaltungsdosis sind 2-mal täglich 1 Kapsel (Mariendistelfrüchte-Extrakt entsprechend 280 mg Silymarin) ausreichend.

Bei längerem Anhalten der Beschwerden sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

Wie und wann sollten Sie Legalon forte 140 mg Kapseln einnehmen?

Die Kapseln sind vor dem Essen unzerkaut mit etwas Flüssigkeit einzunehmen.

Wie lange sollten Sie Legalon forte 140 mg Kapseln anwenden?

Über die Dauer der Anwendung sollte der behandelnde Arzt entscheiden.

Anwendungsfehler und Überdosierung

Was ist zu tun, wenn Legalon forte 140 mg Kapseln versehentlich in zu großen Mengen angewendet wurden?

Bei Überdosierung können die beschriebenen Nebenwirkungen in verstärktem Maße auftreten. In diesem Fall ist der behandelnde Arzt um symptomatische Maßnahmen zu befragen.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Legalon forte 140 mg Kapseln auftreten?

Selten wird eine leicht abführende Wirkung beobachtet. Die in Legalon forte 140 mg Kapseln enthaltene Weizenstärke kann Überempfindlichkeitsreaktionen hervorrufen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und dem inneren Behältnis aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Zusammensetzung

1 Kapsel enthält:

173,0 – 186,7 mg Trockenextrakt aus Mariendistelfrüchten (36 – 44 : 1) entsprechend 140 mg Silymarin, berechnet als Silibinin (Auszugsmittel: Ethylacetat > 96,7 %)

Sonstige Bestandteile:

Lactose, Talkum, Polysorbat 80, Weizenstärke, Magnesiumstearat, Gelatine, Titandioxid (E 171), Eisen(III)-oxid (E 172), Eisen(II,III)-oxid (E 172), Natrium-dodecylsulfat.

Darreichungsform und Inhalt

Packung mit 100 Kapseln

Einfuhr, Umpackung und Vertrieb:

Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH

Am Gänslehen 4 – 5

83451 Piding

Tel.: 08651/704-0

Stand der Information:

September 2005

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Diese Packung wurde von der Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH, 83451 Piding importiert. Der Beipackzettel wurde ebenfalls von der Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH gedruckt und hinzugefügt.